

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucratif use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Maladie	Trt curatif	Posologie	voie	Duré	Trt sympomatique	Surveillance	Prophylaxie	Duré / posologie	Vaccin
Salmonnls Mineurs	Le meilleur bactrim Autres :ciproton -c3g -azitromycine	3cp/j 1g/j 200mg/j 1g	Vo IV	5j 3j	-Réhydratation -Régime diététique -pansement gastrique -ralentisseur du transit -anti sécrétoire		-respect ds règles D'hygiène -control sanitaire -dépistage des Porteurs sains		
Choléra	Doxycycline Erythromycine Bactrim Nitro Furane	A : 200mg/j E : 50mg/kg/j A : 2cp /j A : 400mg/j E : 5mg/kg/j	Vo Vo Vo	3-5j	Réhydratation : De préférence RO si non IV par Ringer lactate ou équivalents de Ringer lactate	Etat hemodyna La conscience La diurèse	-Mesure d'hygiè Indivi -Mesure d'hygiè Collec -declarer la mala -Isolement des m -Chimio-prophy	Bactrim 3 cp En 1 prise Pdt 5j	Sans intérêt (efficacité Courte)
Rickettisio Fievre Bou medi	Doxycycline josamycine ofloxacine ciprofloxacine phénicolé cycline cycline	E:4mg/kg/j A:200mg/j E:50mg/kg/j A:2g/j A:400mg/j A:1g/j	Vo Vo Vo Vo	7j 7j 5-7j 5-7j					
Typ murin Typ epide Fivre Q 1/aigue	doxycycline fluoroqu/rifampicine	200mg/j	Vo	2-3se					

2/endocard	doxycycline + hydroxychloroquine si non doxycycline + ofloxacine et/ou rifampicine	200mg/j 600mg/j	Vo	3ans 3ans					
Herpes 1/menion- Encéph 2/gingivo- somatique Aigue 3/H cutan- Muq (ID) 4/H recur	Aciclovir FS :aciclovir FL :aciclovir Aciclovir Relais oral :zovirax	15mg/kg/8H 5mg/kg/8h 1g/j 10mg/kg/8H 2g/j	IV IV Per os	21j 10j 10j 14j	-anti convulsivants -Mesure de réa -soins locaux - soins locaux -app d'1 pommade 4à6 app/j				
5/H génital recurrent	Aciclovir	1g/j	VO	5j					
Rougeole Trt des compli	Pas de trt antiviral				-eviction scolaire -antipyrrétique -hydratation orale -désinfection ORL par serum physiologiq -vitA prevenir des Compli oculaires Hospitalisation en réa Anticonvulsivant ATB si surinfection : Augmentin Corticothérapie IV Transfusion colots plq		1/collective : -déclaration obli -isolement respi -eviction scolaire -gammaglobuline Standard IM/IV 40-50mg/kg Chez la femme Enceinte ID NN		Vaccin ROR 2 doses : 11 mois 18 mois CI chez femme encei ID

Rubeole	Pas de trt spécifique								Vaccin vivant Attenué ROR :2doses 11mois puis 18mois
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--